

Effet de l'imagerie motrice prolongée sur la préception de l'effort et ses corrélats neuronaux

Thomas Jacquet, Bénédicte Poulin-Charronnat, Romuald Lepers, Patrick Bard, Philippe Pfister, Benjamin Pageaux

► To cite this version:

Thomas Jacquet, Bénédicte Poulin-Charronnat, Romuald Lepers, Patrick Bard, Philippe Pfister, et al.. Effet de l'imagerie motrice prolongée sur la préception de l'effort et ses corrélats neuronaux. 17ème Congrès de l'Association des Chercheurs en Activités Physiques et Sportives (ACAPS), Oct 2017, Dijon, France. hal-01880836

HAL Id: hal-01880836

<https://hal-univ-bourgogne.archives-ouvertes.fr/hal-01880836>

Submitted on 25 Sep 2018

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

EFFET DE L'IMAGERIE MOTRICE PROLONGÉE SUR LA PERCEPTION DE L'EFFORT ET SES CORRÉLATS NEURONAUX

Jacquet T.^{1,2}, Poulin-Charronnat B.¹, Lepers R.², Bard P.¹, Pfister P.¹, Pageaux B.²

¹ LEAD-CNRS UMR5022, Université Bourgogne Franche-Comté

² INSERM-CAPS, Université Bourgogne Franche-Comté

thomas.jacquet@u-bourgogne.fr

INTRODUCTION

L'imagerie motrice (IM) consiste à se représenter mentalement un mouvement sans l'exécution réelle de ce dernier. Réalisée de façon prolongée, l'IM peut induire un sentiment d'épuisement et de manque d'énergie (i.e. fatigue mentale). L'objectif de cette étude est d'évaluer l'impact de l'IM prolongée sur l'activité des aires motrice et prémotrice (mesurée via l'amplitude des potentiels moteurs corticaux, *Motor Related Cortical Potentials* : *MRCPs*) et sur la perception de l'effort (PE) lors de contractions imaginées et réelles des muscles extenseurs du genou.

Hypothèses : (i) l'IM devrait induire une fatigue mentale, qui augmentera la PE lors de contractions imaginées et réelles des muscles extenseurs du genou, et (ii) cette augmentation de la PE devrait être associée à une augmentation de l'amplitude des MRCPs.

MÉTHODES

PE et EVA* toutes les 12.5 min
(50 contractions imaginées)

Visionnage d'un documentaire


Durée : 50 min

200 CMV** imaginées
IM : 5s – Repos : 10s

150 contractions isométriques des muscles extenseurs du genou
Contraction : 2.5s - Repos : 5.5s

PE toutes les 15 contractions

Electroencéphalographie





Mesures :

- Clarté du mouvement imaginé lors de l'IM
- EVA* : échelle visuelle analogique quantifiant la fatigue
- Force développée (CMV** : contraction maximale volontaire)
- Activité électromyographique



RÉSULTATS

Tâche cognitive

Lors de l'IM on observe une augmentation de la sensation de fatigue ($p < 0.001$). On note également une augmentation de l'effort mental nécessaire pour réaliser la tâche ($p = 0.013$) et une augmentation de l'amplitude des MRCPs ($p < 0.01$). Ces deux derniers paramètres sont corrélés ($r = 0.337$; $p < 0.05$)



Tâche physique



Lors de la tâche physique, la force moyenne développée lors des contractions et l'activité électromyographique ne diffèrent pas ($p > 0.928$) entre les conditions.

Comme lors de la tâche mentale, la PE et l'amplitude des MRCPs sont corrélées ($p < 0.05$).

* Toutes les données sont présentes moyennes \pm SEM.

CONCLUSION

La PE et l'amplitude des MRCPs augmentent au cours d'une tâche d'IM et lors d'un exercice physique subséquent. Les changements concomitants de la PE et de l'amplitude des MRCPs mettent en évidence un lien fort entre la PE et l'activité des aires motrice et prémotrice, supportant ainsi le modèle de la décharge corollaire de la PE.

RÉFÉRENCES

- Marcora, S. M., Staiano, W., & Manning, V. (2009). Mental fatigue impairs physical performance in humans. *Journal of Applied Physiology*, 106(3), 857-864.
- de Morree, H. M., Klein, C., & Marcora, S. M. (2014). Cortical substrates of the effects of caffeine and time-on-task on perception of effort. *Journal of Applied Physiology*, 117(12), 1514-1523.
- Pageaux, B., Marcora, S. M., & Lepers, R. (2013). Prolonged mental exertion does not alter neuromuscular function of the knee extensors. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 45(12), 2254-2264.
- Rozand, V., Lebon, F., Stapley, P. J., Papaxanthis, C., & Lepers, R. (2016). A prolonged motor imagery session alter imagined and actual movement durations: Potential implications for neurorehabilitation. *Behavioral Brain Research*, 297, 67-75.